

## A

opakowanie, kategoria dostępności, EAN	cena (limit)	odpłatność i opłata
--	--------------	---------------------

[10-49] ATC: N05AX (Otsuka; UK) EU/1/04/276

<b>Abilify</b> tabl. 15 mg • <i>Aripiprazolum</i> (B $\diamond$ )		R→p2,p5
28 tabl. w blistrach (28 unit doses) <sup>Rp</sup> EAN~0002306	<b>410,11</b> (410,11)	3,20

[10-19] ATC: N03AG (Orion; FI)

<b>Absenor</b> tabl. retard 300 mg • <i>Natrii valproas</i> (B $\diamond$ )		B→p1   R→n1
100 tabl. <sup>Rp</sup> EAN~0042371	<b>42,89</b> (42,89)	0,00   3,20

odpowiedniki: Absenor [0,86 zł] • ValproLEK 300 [0,95 zł] • Depakine Chrono 300 [1,18 zł] • Orfiril 300 retard [1,29 zł] • Orfiril Long 300 [1,29 zł]

[10-19] ATC: N03AG (Orion; FI)

<b>Absenor</b> tabl. retard 500 mg • <i>Natrii valproas</i> (B $\diamond$ )		B→p1   R→n1
100 tabl. <sup>Rp</sup> EAN~0042364	<b>70,95</b> (70,95)	0,00   3,56

odpowiedniki: Absenor [1,42 zł] • ValproLEK 500 [1,54 zł] • Depakine Chrono 500 [1,63 zł] • Orfiril Long 500 [1,79 zł] • Depakine Chronosphere 500 [1,86 zł]

[3-36] ATC: C09AA (Parke-Davis/Gödecke; DE)

<b>Accupro 5</b> tabl. powł. 5 mg • <i>Quinaprilum</i> (B $\diamond$ )		R
30 tabl. <sup>Rp</sup> EAN~0706914	<b>16,41</b> (1,85)	16,41

odpowiedniki: AprilGen 5 mg [0,37 zł] • Quinapril TEVA 5 mg [0,40 zł] • Acurenal [0,42 zł] • Accupro 5 [0,55 zł]

[3-36] ATC: C09AA (Parke-Davis/Gödecke; DE)

<b>Accupro 10</b> tabl. powł. 10 mg • <i>Quinaprilum</i> (B $\diamond$ )		R
30 tabl. <sup>Rp</sup> EAN~0707010	<b>20,79</b> (3,69)	20,30

odpowiedniki: AprilGen 10 mg [0,46 zł] • Quinapril TEVA 10 mg [0,49 zł] • Acurenal [0,56 zł] • Accupro 10 [0,69 zł]

[3-36] ATC: C09AA (Parke-Davis/Gödecke; DE)

<b>Accupro 20</b> tabl. powł. 20 mg • <i>Quinaprilum</i> (B $\diamond$ )		R
30 tabl. <sup>Rp</sup> EAN~0707119	<b>26,49</b> (7,39)	23,37

odpowiedniki: Acurenal [0,65 zł] • AprilGen 20 mg [0,65 zł] • Quinapril TEVA 20 mg [0,67 zł] • Accupro 20 [0,88 zł]

[3-36] ATC: C09AA (Parke-Davis/Gödecke; DE)

<b>Accupro 40</b> tabl. powł. 40 mg • <i>Quinaprilum</i> (B $\diamond$ )		R
28 tabl. <sup>Rp</sup> EAN~1080129	<b>41,78</b> (13,79)	35,95

odpowiedniki: AprilGen 40 mg [1,13 zł] • Quinapril TEVA 40 mg [1,17 zł] • Accupro 40 [1,49 zł]

[2-01] ATC: B01AA (WZF Polfa; PL)

<b>Acenocumarol WZF</b> tabl. 4 mg • <i>Acenocoumarolum</i> (B)		R
60 tabl. <sup>Rp</sup> EAN~0055715	<b>12,07</b> (12,07)	5,12

[2-13] ATC: B03BB (Gedeon Richter; PL)

<b>Acidum folicum Richter</b> tabl. 5 mg • <i>Acidum folicum</i>		R
30 tabl. <sup>Rp</sup> EAN~0109210	<b>1,96</b> (1,00)	1,96

odpowiedniki: Acidum folicum Richter [0,07 zł] • Folicid [0,07 zł]

[2-13] ATC: B03BB (Gedeon Richter; PL)

<b>Acidum folicum Richter</b> tabl. 15 mg • <i>Acidum folicum</i>		R
30 tabl. <sup>Rp</sup> EAN~0109319	<b>2,99</b> (2,99)	2,99

odpowiedniki: Acidum folicum Richter [0,10 zł] • Folicid [0,10 zł]

## OBJAŚNIENIA

kod do odszukania preparatu w indeksie ATC i porównania kosztów terapii (różowe strony).

różne rodzaje odpłatności oddzielone są znakiem „|”. Na pierwszym miejscu symbol odpłatności we wszystkich wskazaniach (30%), a po znaku „|” odpłatność R (ryczałt) dla szczególnych wskazań e1 oraz e2.

1-12 ATC: A07EC

(Bella Pharma; PL)

**Bellamax 500** tabl. dojelitowe 500 mg • *Mesalazinum*

30% | R→e1,e2

100 tabl. <sup>Rp</sup>

EAN~1084217

148,82 (82,41)

111,06 | 69,60

odpowiedniki: Anamax 500 [3,48 zł] • Salogal 500 [4,30 zł] • Bellamax 500 [5,64 zł] • Anenter 500 [6,12 zł]

grupa odpowiedników dokładnych w kolejności wzrastających cen jednostki dawkowania (wa rtość w nawiasie). Zamiennie może być wydany każdy lek z tej grupy o cenie jednostki dawkowania niższej niż cena produktu zapisanego na receptycie – czyli każdy w grupie wymieniony przed nim.

**Rp**: lek wydawany na receptę;  
**Rpz**: wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania  
**Rpw**: na receptę różową z wórnikiem.

urzędowa cena detaliczna (wytuszczenie) i limit finansowania (w nawiasie) – do wartości limitu odnosi się odpłatność.

rodzaje odpłatności: bezpłatny (B) we wskazaniu szczególnym c1 lub ryczałtowa odpłatność (R) we wskazaniach n7 oraz n8. Indeks wskazań szczególnych znajduje się na zielonych stronach książki.

10-03 ATC: N0

(Gayer; DE)

**Genedol** tabl. powł. 20 mg • *Morphinum* (I-N♦)

B→c1 | R→n7,n8

60 tabl. (6x10) <sup>Rpw</sup>

EAN~0526425

80,77 (80,77)

0,00 | 3,20

odpowiedniki: Poxedur [1,21 zł] • Genedol [1,35 zł] • Amedac [1,95 zł] • Orman [2,12 zł]

grupa substancji - według klasyfikacji środków odurzających i psychotropowych.

ostatnie 7 znaków kodu EAN13 lub inny kod wymieniony w obwieszczeniu.

opłata pacjenta odpowiadająca rodzajowi odpłatności.

nazwa substancji i grupa A -bardzo silnie działająca, B -silnie działająca, N -narkotyczna, P -psychotropowa. ◊ -lek może upośledzać psychomotorycznie, ♦ -upośledza psychomotorycznie.

symbol ⊗ oznacza opakowanie leku, którego nie znaleziono w ofercie rynkowej w czasie opracowywania książki.

3-49 ATC: C09AA

(Centifis; FR)

**Quintace** kaps. 5 mg • *Ramiprilum* (B)

R

20 kaps. <sup>Rp</sup>

EAN~0457722

9,46 (7,39)

4,97 ⊗

30 kaps. <sup>Rp</sup>

EAN~0457715

11,52 (11,08)

6,84

odpowiedniki: Viramil 5 [0,21 zł] • Quintace [0,23 zł] • Ramifar [0,35 zł] • Entace 5 [0,42 zł]

odpowiedniki tańsze od zapisanego na receptycie są wydawane zamiennie zgodnie z ich własną ceną, limitem i opłatą pacjenta.

odpowiedniki droższe od zapisanego na receptycie nie mogą być wydawane jako zamienniki.

## Rodzaje odpłatności

Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia i wyroby medyczne są objęte refundacją:

- w pełnym zakresie zarejestrowanych wskazań.
- w zakresie ograniczonym do wskazań wyszczególnionych w odpowiednim obwieszczeniu.

Preparaty refundowane w pełnym zakresie wskazań oznaczone są w książce symbolem odpłatności bez symbolu wskazania:

<b>R</b>	odpłatność ryczałtowa do wysokości limitu, pełny zakres zarejestrowanych wskazań
<b>30%</b>	odpłatność 30% limitu, pełny zakres zarejestrowanych wskazań
<b>50%</b>	odpłatność 50% limitu, pełny zakres zarejestrowanych wskazań

Refundacja w szczególnych wskazaniach jest oznaczona w książce przy preparacie symbolem wskazania (np. b4), poprzedzonym rodzajem odpłatności dla tego wskazania (np. 30%→b4):

<b>B→y3</b>	bezpłatnie do wysokości limitu we wskazaniu o symbolu y3
<b>R→q5</b>	odpłatność ryczałtowa do wysokości limitu we wskazaniu o symbolu q5
<b>30%→x7</b>	odpłatność 30% do wysokości limitu we wskazaniu o symbolu x7
<b>50%→v9</b>	odpłatność 30% do wysokości limitu we wskazaniu o symbolu v9

W przypadku preparatu, dla którego istnieje kilka możliwych rodzajów odpłatności oznaczenie w książce jest kombinacją opisanych wyżej symboli; na pierwszym miejscu jest odpłatność w grupie produktów refundowanych w pełnym zakresie wskazań (jeżeli występuje), a następnie rodzaje odpłatności w poszczególnych wskazaniach, na przykład:

**50% | B→y3,w2 | 30%→x7**

oznacza preparat o odpłatności 50% limitu finansowania w przypadku stosowania w ramach pełnego zakresu zarejestrowanych wskazań lub wydawany bezpłatnie do wysokości limitu we wskazaniach o symbolach y3 oraz w2 lub odpłatność 30% do wysokości limitu finansowania we wskazaniu o symbolu x7.

## Indeks wskazań szczególnych i leków wydawanych w określonych wskazaniach wraz z rodzajami odpłatności znajduje się na zielonych stronach książki.

### Symbole wskazań szczególnych, w których wydawane są leki refundowane:

symbol	wskazanie szczególne	grupa
c1	nowotwory złośliwe	nowotwory
c2	ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwałe działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	
c3	neutropenia w chorobach nowotworowych	
c4	przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	
c5	wymioty wczesne albo opóźnione u osób dorosłych związane z emetogenną chemioterapią cisplatiną w dawce większej niż 70 mg/m <sup>2</sup> – profilaktyka	
c6	rak piersi i rak trzonu macicy	
c7	wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii	
c8	rak piersi w II rzucie hormonoterapii	
c9	przerost gruczołu krokowego	
c10	rak prostaty	
e1	wrzodziejące zapalenie jelita grubego	jelitowe
e2	choroba Leśniowskiego–Crohna	
g1	epidermolysis bullosa – pęcherzowe odwarstwianie naskórka	genetyczne
g2	pierwotna dyskineza rzęsek	
h1	osteoporoza	hormonalne
h3	akromegalia	
h4	moczówka prosta przysadkowa	
h5	niedoczynność tarczycy	
h6	endometrioza	

symbol	wskazanie szczególne	grupa	
i1	aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów	auto-immuno	
i2	miastenia		
m1	cukrzyca	metaboliczne	
m2	cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej		
m5	fenyloketonuria		
m6	hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawałe serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemia rodzinna		
m7	zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe		
m8	mukowiscydoza		
m9	stan po resekcji trzustki		
n1	padaczka		neurologiczne
n2	padaczka oporna na leczenie		
n3	choroba i zespół Parkinsona		
n4	choroba Alzheimerera		
n5	stwardnienie rozsiane		
n6	stwardnienie zanikowe boczne		
n7	neuralgia popópaścowa przewlekła		
n8	wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia		
n9	zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym		
p1	choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	psychiatryczne	
p2	schizofrenia		
p3	schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami, w wyniku udokumentowanego uporczywego braku współpracy chorego		
p4	schizofrenia u dorosłych, u których uzyskano stabilizację podczas leczenia olanzapiną doustną, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego		
p5	choroba afektywna dwubiegunowa		
p6	nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6 roku życia		
p7	nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży		
r1	astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	oddechowe	
r2	ciężka postać przewlekłej obturacyjnej choroby płuc z udokumentowaną badaniem spirometrycznym wartością wskaźnika FEV1<50% oraz ujemną próbą rozkurczową		
r3	gruźlica, w tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy		
s1	jaskra	oczne	
t1	stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	przeszczepy	
t2	zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepem narządów mięszszowych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie		
v1	stan po zawałe mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania	krążeniowe	
v2	stan po zawałe mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania		

<b>symbol</b>	<b>wskazanie szczególne</b>	<b>grupa</b>
v3	miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom	
v4	udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II–NYHA IV	
v5	udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA III–NYHA IV po udokumentowanym niepowodzeniu leczenia furosemidem	
v6	złyne powikłania zakrzepowo–zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) – prewencja pierwotna	
v7	przewlekłe owrzodzenia	